

UN TUCUSITO NUEVO PARA VENEZUELA

Ramón AVELEDO HOSTOS

Miembro Correspondiente

En este trabajo informamos de la ocurrencia de una nueva especie de la familia *Trochilidae* (Tucusitos, Chupa Flores), que fué encontrada en las Islas Tobeina y Tobejuba, en el Delta del Río Orinoco, durante la colección efectuada en el mes de agosto de 1954 por la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle.

***Amazilia leucogaster leucogaster* (Gmelin)**

Trochilus leucogaster Gmelin, Syst., Nat., 1, pt. 1, 1788, p. 495. (ex Brisson, Buffon, etc.; Cayena designada como localidad típica por Berlepsch, Nov. Zool., 15, 1908, p. 265.)

1 ♀, Isla Tobejuba, Territorio Delta Amacuro, Cat. Aves N° 3206.

1 ♀, Isla Tobeina, Territorio Delta Amacuro, Cat. Aves N° 3207.

Ambos ejemplares están marcados como del sexo femenino, pero sólo uno de ellos tiene la gonada dibujada en la etiqueta; es, pues, posible, que en el otro ejemplar no se haya podido ver con claridad el sexo del ave, y que por lo tanto se tratara de un macho en vez de hembra. Además, se puede observar que difieren el uno del otro, por presentar el de la Isla Tobeina un tinte azulado en la cabeza y lados del cuello, mientras que el de la Isla Tobejuba, que tiene las gonadas dibujadas en la etiqueta, es verde dorado en la parte superior y lados del cuello, sin presentar contraste como en el otro ejemplar. También es diferente a 10 machos de las Guayanas Francesa y Holandesa, ya que ninguno de ellos tiene el tinte azulado tan notable como el de nuestro ejemplar.

La ♀ de Tobejuba es completamente similar a las hembras topotípicas de la Guayana Francesa y a algunos de los ejemplares machos.

Los ejemplares a que nos referimos extienden el área de distribución de la especie *A. leucogaster* a Venezuela, siendo este el límite más septentrional a que se ha encontrado. Lo referimos a la subespecie *leucogaster*, cuya distribución comprende Las Guayanas y Brasil, en los Estados de Pará, Maranhao y Piauhy. La otra raza conocida habita en el este del Brasil, desde Pernambuco hasta Bahía.

UN NUEVO TUCUSITO PARA VENEZUELA

Sería necesario estudiar una serie de estas aves para poder determinar con seguridad si debe referirse a la raza *leucogaster* o amerita un nuevo nombre subespecífico en Venezuela.

MEDIDAS DE LOS EJEMPLARES.—♀ de la Isla Tobejuba: ala, 50 milímetros; cola, 28 mm.; culmen expuesto, 24 mm.; culmen desde la base, 27 mm.—♀ de la Isla Tobeina: ala, 51 mm.; cola, 29 mm.; culmen expuesto, 23 mm.; culmen desde la base, 26,5 mm.

EJEMPLARES EXAMINADOS.—9 ♂, 3 ♀, Cayena; 1 ♂, 3 (?), Surinam; 1 ♀, Guayana Francesa. Todos en el Museo de Historia Natural de Nueva York.

Agradecemos a los Conservadores de aves del Museo de Historia Natural de Nueva York su gentileza al habernos permitido el estudio de sus series.