

LISTA DE LAS AVES COLECCIONADAS EN LA ESTACION BIOLOGICA DE LOS LLANOS

Por **Ramón AVELEDO H.**

Conservador de la Colección Phelps

En el presente trabajo damos una lista parcial de las aves que habitan en la Estación Biológica de Los Llanos.

Del 18 al 31 de marzo de 1960, el Museo Ornitológico Phelps envió al colector Ramón Urbano para realizar la recolección de las aves que viven allí, la cual realizó fuera de los límites de dicha Estación.

Durante estos catorce días se obtuvieron sesenta y una especies de aves y se llevó una estadística de la abundancia diaria (A.D.) de las especies observadas dentro de los límites de la Estación.

También incluimos algunas aves coleccionadas por el Perito Forestal Rafael Antonio Espejo, encargado de dicha Estación. En esta lista informamos del número de ejemplares obtenidos de cada especie y de su promedio diario de abundancia, cuando disponemos de este dato.

Estas aves han sido donadas por la Colección Ornitológica Phelps a la Estación Biológica de Los Llanos para el Museo que se está desarrollando en este Centro y que se continuará, en lo que respecta a las aves, hasta tener una colección completa de las especies que viven allí.

Caracara plancus cheriway (Jacquin)

CARICARE

Falco cheriway Jacquin, Beytr. Gesch. Vogel, p. 17, pl. 4, 1784.
(Isla de Aruba).

Polyborus cheriway cheriway, Peters, Bds. of World, 1, p. 280, 1931.

1 ♂

A. D. 2.

Falco femoralis femoralis Temminck HALCON PALOMERO

Falco femoralis Temminck, Pl. Col., livr. 58, pl. 121, livr. 21, p. 343, 1822. (Brasil; ex Natterer.)

1 ♀

Falco sparverius isabellinus Swainson HALCON PRIMITO

Falco isabellinus Swainson, Anim. in Menag., p. 281, 1837. (Guayana Inglesa.)

A. D. 3.

Ortalis ruficauda ruficauda (Jardine) GUACHARACA

Ortalis ruficauda Jardine, Ann. Mag. Nat. Hist., 20, p. 374, 1847. (Isla de Tabago.)

1 ♂

Colinus cristatus sonnini (Temminck) PERDIZ

Perdix Sonnini Temminck, Hist. Nat. Pig. Gall., 3, p. 451, 1815. (Ninguna localidad típica indicada, pero evidentemente es la Guayana Francesa según Hellmayr y Conover 1942: 257.)

3 ♂, 2 ♀

A. D. 10.

Belonopterus cayennensis cayennensis (Gmelin) ALCARAVAN

Parra cayennensis Gmelin, Syst. Nat., 1, (2), p. 706, 1789. (Cayena; ex Daubenton.)

1 ♂

A. D. 0, 2.

Erolia minutilla (Vieillot) PLAYERITO MENUDO

Tringa minutilla Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 34, p. 466, 1819. (Halifax, Nueva Escocia.)

1 ♀

Rynchops nigra cinerascens Spix PICO DE TIJERA

Rynchops cinerascens Spix, Av. Bras., 2, p. 80, pl. 102, 1825. (Río Amazonas, Brasil.)

1 ♂ [juv]

Columba cayennensis pallidicrissa Chubb PALOMA SELVATICA

Columba pallidicrissa Chubb, Ibis, p. 60, 1910. (Costa Rica.)

1 ♀

Zenaidura auriculata stenura (Bonaparte) PALOMA SABANERA

Zenaida stenura Bonaparte, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 40, N^o 3, p. 98, para Enero 15, 1855. ("Columbia").

2 ♀

A. D. 8.

Scardafella squammata ridgwayi Richmond MARAQUITA

Scardafella ridgwayi Richmond, Proc. U. S. Nat. Mus., 18, p. 660, 1896. (Isla de Margarita, Venezuela).

2 ♂

A. D. 10.

Columbigallina passerina albivitta (Bonaparte) TORTOLITA

Chamaepelia albivitta Bonaparte, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 40, p. 21, 1855. (Cartagena, Colombia).

1 ♂ [juv], 1 ♀

A. D. 11.

Ara macao (Linné) GUACAMAYO BANDERA

Psittacus Macao Linné, Syst. Nat., 10^o ed., 1, p. 96, 1758. ("Amé-

rica meridionali"; Bajo Amazonas sugerida como localidad típica por Pinto 1938: 182).

1 ♂

Ara severa severa (Linné)

MARACANO

Psittacus severus Linné, Syst. Nat., 10^o ed., 1, p. 97, 1758. ("in Indiis"; *errore*, Río Amazonas sustituida como localidad típica por Hellmayr 1906: 578).

1 ♂

Aratinga pertinax venezuelae Zimmer y Phelps CARA SUCIA

Aratinga pertinax venezuelae Zimmer y Phelps, Am. Mus. Nov., N^o 1511, p. 6, Mayo 8, 1951. (Altigracia, Río Orinoco, Bolívar, Venezuela).

3 ♂

A.D. 2.

Piaya cayana mehleri Bonaparte

PISCUA

Piaya mehleri Bonaparte, Consp. Av., 1, p. 110, 1850. (Bogotá, Colombia; Cartagena sustituida como localidad tipo por Schauensee 1946: 2).

A. D. 1

Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson

CURTIDOR

Crotophaga sulcirostris Swainson, Philos. Mag., (n. s.), 1, p. 400, 1827. (Temascaltepec, México).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 10.

Glaucidium brasilianum medianum Todd

PAVITA

Glaucidium brasilianum medianum Todd, Proc. Biol. Soc., Wash., 29, p. 98, Junio 6, 1916. (Bonda, Santa Marta, Colombia).

2 ♂

A. D. 1.

Speotyto cunicularia brachyptera Richmond

MOCHUELO DE HOYO

Speotyto brachyptera Richmond, Proc. U. S. Nat. Mus., 18, p. 663, 1896. (Al este de Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela).

1 ♀

Nyctidromus albicollis albicollis (Gmelin)

AGUAITACAMINO COMUN

Caprimulgus albicollis Gmelin, Syst. Nat., 1, (2), p. 1030, 1789. (Cayena).

1 ♂ [juv].

Reinarda squamata squamata (Cassin) VENCEJO LLANERO

Cypselus squamatus Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 6 p. 369, 1853. (Guayana Inglesa).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 21.

Chlorostilbon mellisuga caribaeus Lawrence

COLIBRI ESMERALDA

Chlorostilbon caribaeus Lawrence, Ann. Lyc. Nat. Hist. New York, 10, p. 13, 1871. (Isla de Curazao).

2 ? 1 ? [♀].

Amazilia tobaci feliciae (Lesson).

AMAZILIA BRONCEADA COLIAZUL

Ornismaya Feliciae Lesson, Rev. Zool., p. 72, 1840. (Distrito de Sao José, Brasil; *errore*, la localidad típica ha sido restringida a la región de Caracas por Todd 1942: 326).

1 ♀, 1 ?

Galbula ruficauda ruficauda Cuvier TUCUSO DE MONTAÑA

Galbula ruficauda Cuvier, Règne Animal, 1, p. 420, 1817 (1816). ("La Guyane"; Cayena, *ex* Le Vaillant).

1 ♂, 1 ♀

Hypnelus bicintus bicintus (Gould) AGUANTAPIEDRA

Tamatia bicincta Gould, Proc. Zool. Soc. London, p. 80, 1836 (1837). ("Cayenne ?", *errore*; Venezuela sustituida por Berlepsch y Hartert 1902: 102; restringida la localidad típica a San Esteban, Carabobo).

1 ♂, 1 ♀

Centurus rubricapillus rubricapillus (Cabanis) CARPINTERO HABADO

Centurus rubricapillus Cabanis, Journ. Orn., 10. p. 328, 1862. (Barranquilla, Colombia).

3 ♂

A. D. 3.

Xiphorhynchus picus phalara Wetmore SUBESUBE LLANERO

Dendroplex picirostris phalara Wetmore, Smithsonian Misc. Coll., 98, N^o 4, p. 4, Mar. 10, 1939. (El Sombrero, Guárico, Venezuela).

2 ♂

Sakesphorus canadensis intermedius (Cherrie) HORMIGUERO COPETON

Hypolophus canadiensis intermedius Cherrie, Bull. Mus. Brookl. Inst. Sci., 2, p. 277, 1916. (Caicara, Río Orinoco, Bolívar, Venezuela).

2 ♂, 1 ♀

A. D. 0, 5.

Pyrocephalus rubinus saturatus Berlepsch y Hartert ATRAPAMOSCAS SANGRE DE TORO

Pyrocephalus rubinus saturatus Berlepsch y Hartert, Nov. Zool. 9, p. 34, 1902. (Altagracia, Río Orinoco, Bolívar, Venezuela).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 1

Machetornis rixosa obscuradorsalis Phelps y Phelps, Jr. JINETE

Machetornis rixosa obscuradorsalis Phelps y Phelps Jr., Bol. Soc. Ven Cien. Nat., N^o 71, p. 66, Oct.-Dic., 1947. (Ciudad Bolivia, Barinas Venezuela).

1 ♀

A. D. 0, 4.

Muscivora tyrannus monachus (Hartlaub) TIJERETA

Tyrannus (Milvulus) monachus Hartlaub, Rev. Zool., 7, p. 214. 1844. (Guatemala).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 5.

Tyrannus melancholicus chloronotus Berlepsch CHICHARRERO

Tyrannus chloronotus Berlepsch, Ornith., 14, p. 474, 1907. (Tmax, Yucatán).

2 ♂

A. D. 4

Empidonomus varius rufinus (Spix) TUQUITO

Muscicapa rufina Spix. Av. Bras., 2, p. 22, pl. 31, figs. 1, 2, 1825. ("in provincia fl. Amazonum", Brasil).

1 ♂

Myiozetetes cayanensis rufipennis Lawrence PECHO AMARILLO

Myiozetetes rufipennis Lawrence, Ann. Lyc. Nat. Hist. N. Y., 9, p. 267, 1869. (Valencia, Carabobo, Venezuela).

2 ♂

A. D. 0, 2.

Pitangus sulphuratus rufipennis (Lafresnaye) CRISTOFUE

Saurophagus rufipennis Lafresnaye, Rev. Mag. Zool., (2) 3, p. 471, 1851. (Caracas, Venezuela).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 3.

Myiarchus tyrannulus tyrannulus (P. L. S. Müller)

GARROCHERO

Muscicapa tyrannulus P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl., p. 169, 1776. (Basado en Daubenton, Pl. Enl. 571, fig. 1, Cayena).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 1.

Tolmomyias flaviventris collingwoodi (Chubb)

PICO CHATO AMARILLENTO

Rhynchocyclus flaviventris collingwoodi Chubb, Bull. Brit. Orn. Club, 40, p. 109, 1920. (Macqueripe Valley, Isla de Trinidad).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 0, 3.

Todirostrum cinereum cinereum (Linné)

TITIRIJI LOMICENIZO

Todus cinereus Linné, Syst. Nat., 12^o ed., 1, p. 178, 1766. (Basado en "The Grey and Yellow Flycatcher" Edwards, Glean, Nat. Hist., 2, p. 110, pl. 262, fg. inferior; Surinam).

2 ♀

A. D. 2.

Atalotriccus pilaris venezuelensis Ridgway

PICO CHATO PIGMEO

Atalotriccus pilaris venezuelensis Ridgway, Proc. Biol. Soc. Wash., 19, p. 115, Sept. 6, 1906. (San Antonio, Bermúdez = Monagas, Venezuela).

1 ♂, 1 ♀

Elaenia flavogaster flavogaster (Thunberg)

BOBITO COPETON DE VIENTRE AMARILLO

Pipra flavogaster Thunberg, Mém. Acad. Imp. Sci., St. Pétersb. 8, p. 286, 1822. (Brasil = Río de Janeiro, según Hellmayr 1927: 402).

2 ♀

A. D. 3.

Sublegatus arenarum glaber Sclater y Salvin
BOBITO ENCRESTADO

Sublegatus glaber Sclater y Salvin, Proc. Zool. Soc. London, p. 171, pl. 13, fig. 2, 1868. (Caracas, Venezuela).

1 ♂

Phaeomyias murina incomta (Cabanis y Heine)
ATRAPAMOSCAS COLOR DE RATON

Elainea incomta Cabanis y Heine, Mus. Hein, 2, p. 59, 1859. (Cartagena, Colombia).

2 ♂, 1 ♀

Hirundo rustica erythrogaster Boddaert
GOLONDRINA DE HORQUILLA

Hirundo erythrogaster Boddaert, Tabl. Pl. Enl., p. 45, Dic., 1783. (Basado en la "Hirondelle à ventre roux de Cayenne" Daubenton, Pl. Enl. 724, fig. 1; Cayena).

2 ?

Tachycineta albiventer (Boddaert) GOLONDRINA DE AGUA

Hirundo albiventer Boddaert, Table Pl. Enl., p. 32, 1783. (Cayena).

1 ♂

A. D. 1.

Campylorhynchus griseus minor (Cabanis) CURRUCUCHU

Heleodytes minor Cabanis, Mus. Hein., 1, p. 80, 1851. ("Venezuela"; sugerimos a Ciudad Bolívar, Bolívar, como localidad típica).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 4.

Mimus gilvus melanopterus Lawrence PARAULATA LLANERA

Mimus melanopterus Lawrence, Ann. Lyc. Nat. Hist. N. Y., 5,

Nº 1, p. 35, pl. 2, Mayo 1849. (Venezuela; sugerimos a Cumaná, Sucre, como localidad típica).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 6.

Polioptila plumbea plumbiceps Lawrence

CHIRITO DE CHAPARRALES

Polioptila plumbiceps Lawrence, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. 17, p. 37, 1865. ("Venezuela"; Tucacas, Falcón, sugerida como localidad típica por Zimmer 1942b: 5).

1 ♂, 1 ♀

Cyclarhis gujanensis parvus Chapman

SIRIRI

Cyclaris flavipectus parvus Chapman, Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 36, p. 541, 1917. (Villavicencio, Colombia).

2 ♂, 1 ♀

A. D. 0, 3.

Hyalophilus aurantiifrons saturatus (Hellmayr)

VERDERON DE FRENTE OCRE

Pachysylvia aurantiifrons saturata Hellmayr, Nov. Zool., 13, p. 12, 1906. (Ninguna localidad típica indicada; el tipo es de Rincón de San Antonio, "Sucre" [= Monagas], Venezuela, según Hellmayr 1935: 171).

1 ♂, 1 ♀

Coereba flaveola luteola (Cabanis)

REINITA COMUN

Certhiola luteola Cabanis, Mus. Hein., 1, p. 96, 1851. ("Puerto Cabello (?)", Venezuela; aceptamos a Puerto Cabello, Carabobo, como localidad típica).

2 ♂, 1 ♀

Dendroica petechia aestiva (Gmelin)

CANARIO DE MANGLE MIGRATORIO

Motacilla destiva Gmelin, Syst. Nat., 1, (2), p. 996, 1789 (Canadá).

1 ♂

A. D. 3.

Cacicus cela cela (Linné)

ARRENDAJO COMUN

Parus Cela Linné, Syst. Nat., 10^o ed., 1, p. 191, 1758. ("in Indiis"; error, Surinam sustituida como localidad típica por Hellmayr 1906b: 20).

2 ♂, 1 ♀

A. D. 0, 7.

Molothrus bonariensis venezuelensis Stone

MIRLO

Molothrus venezuelensis Stone, Auk, 8, p. 347, 1891. ("Venezuela"; el tipo es del Lago de Valencia según Wetmore 1939: 250).

1 ♂, 1 ♀

Quiscalus lugubris lugubris Swainson

TORDO NEGRO

Quiscalus lugubris Swainson, Anim. Menag., p. 299, 1838. ("Brazil"; error, Guayana Inglesa sustituida por Berlepsch y Hartert 1902: 33).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 12

Icterus nigrogularis nigrogularis (Hahn)

GONZALITO

Xanthornus nigrogularis Hahn, Vogel aus Asien, Africa, etc., livr. 5, pl. 1, 1819. ("Jamaica, México y Cayenne"; el tipo es de "Brazil" según Hellmayr 1937: 132).

2 ♂, 3 ♀

A. D. 1.

Gymnomystax mexicanus (Linné)

TORDO MAICERO

Oriolos mexicanus Linné, Syst. Nat., 12^a ed., 1, p. 162, 1766. (Basado en "Le Troupiale brun de la Nouvelle Espagne" Brisson, Orn., 2, p. 105; "México"; error, Cayena sustituida como localidad típica por Berlepsch y Hartert 1902: 32).

3 ♂

A. D. 4.

Sturnella magna paralius Bangs

PERDIGON

Sturnella magna paralius Bangs, Proc. New Engl. Zool. Club, 2, p. 56, 1901. (San Sebastián, Santa Marta, Columbia; 2000 m.)

1 ♂, 1 ♀

A. D. 3.

Tanagra trinitatis (Strickland)

SAUCITO

Euphonia trinitatis Strickland, Contr. Orn., Pt. 2, p. 72, Marzo, 1851. (Trinidad, Venezuela y "St. Thomas" error; el tipo es de la Isla de Trinidad según Hellmayr 1936: 37).

1 ♂

Tanagra cayana cayana (Linné)

MONJITA

Tanagra cayana Linné, Syst. Nat., 12^a éd., 1, p. 315, 1766. (Basado en "Le Tanagra verd, de Cayenne" Brisson, Orn., 3, p. 21, pl. 4, fig. 3, 1760; Cayena).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 0, 6

Thraupis virens cana (Swainson) AZULEJO DE JARDINES

Tanagra cana Swainson, Orn. Draw., Pt. 3, pl. 37, 1836. (Ninguna localidad típica indicada: "Venezuela" sugerida por Berlepsch 1912: 1051; restringida a Caracas por Hellmayr 1924a: 185).

1 ♂, 1 ♀

A. D. 1.

Volatinia jacarina splendens (Vieillot)

CHIRRI

Fringilla splendens Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd. 12, p. 173. 1817. (Basado en el "Moineau, de Cayenne" Daubenton, Pl. Enl. 224, fig. 3; Cayena).

1 ♂ [juv], 1 ?

A. D. 1.

Sicalis flaveola flaveola (Linné)

CANARIO DE TEJADO

Fringilla flaveola Linné, Syst. Nat., 12^a éd., 1, p. 321, 1766.

(patria ignota; Surinam sugerida como localidad típica por Berlepsch y Hartert 1902: 27).

3 ♂, 1 ?

A. D. 3.

Myospiza humeralis humeralis (Bosc)

SABANERITO DE PAJONALES

Tanagra humeralis Bosc, Journ. d'Hist. Nat. (Choix de Mémoires), 2, N^o 17, p. 179, pl. 34, fig. 4, Sept. 1, 1792. (Cayena).

1 ♂, 2 ?

A. D. 3.

Emberizoïdes herbicola apurensis Gilliard

SABANERO COLUDO

Emberizoides herbicola apurensis Gilliard, Am. Mus. Nov., N^o 1071, p. 12, Junio 5, 1940).

1 ♀

A. D. 0, 1.