

# DOCE AVES VENEZOLANAS

RAMON AVELEDO H.

FOTOGRAFÍAS DE PAUL SCHWARTZ

De las 8.600 especies de aves conocidas en el mundo, 1.282 habitan o visitan a Venezuela y están distribuidas en nuestros tres grandes tipos de morfología geográfica: las vastas llanuras, las montañas andinas y las selvas y macizos de Guayana, además de los ríos, costas e islas del Caribe. Estos seres alados, de múltiples formas y colores, llenan unas de las funciones más importantes como factores fundamentales en el maravilloso equilibrio de la naturaleza. Millones de insectos nacen diariamente y sólo les bastaría poco tiempo para convertir a la tierra en un lugar inhabitable para el hombre; sólo la voracidad de las aves puede ejercer un control eficaz, ya que los insectos constituyen el alimento de la mayoría de ellas.

Como elementos de gracia y belleza llenan otra función primordial en nuestra vida; por consiguiente, protegerlas y conservarlas es una necesidad de primer orden por razones económicas y espirituales.

Debemos aprender a disfrutar de nuestras aves en su medio natural de vida, aprovechando el goce estético que nos producen al verlas en nuestros jardines o al escuchar la armonía de sus cantos, pero siempre en libertad, dejándolas cumplir su inapreciable misión.

En este trabajo se presentan doce de este grupo de aves de Venezuela, hábilmente captadas en función de vida por el distinguido ornitólogo Paúl Schwartz.

ZAMBULLIDORES  
PATICO ZAMBULLIDOR

FAMILIA: PODICIPEDIDAE  
PODICEPS DOMINICUS (Linnaeus)



En nuestras lagunas, agregando una nota de belleza al paisaje, encontramos esta interesante ave de costumbres tan particulares, la cual hace de las aguas su verdadera morada. Son ágiles nadadores, especialmente debajo del agua, en cuyo medio encuentran su alimento que consiste en pequeños peces y otros animalitos. Su nombre hace alusión a la característica más importante de la especie: zambullirse y nadar largos trechos debajo del agua, para sólo asomar la cabeza de vez en cuando y respirar. En algunas oportunidades los vemos realizar esta operación nadando con su cría a las espaldas, y, cuando los acosa algún peligro, se zambullen vertiginosamente, para luego aparecer a distancia aún con sus pichones en el mismo sitio. Por esta razón, en algunos lugares de Venezuela se les llama también "buzos". Suelen encontrarse en pequeños grupos de dos a seis; pero en algunas oportunidades llegan a reunirse bandadas de cuarenta o más.

Su nido lo fabrica con hierbas acuáticas, el cual una vez elaborado forma un pequeño promontorio flotante que siempre está atado con una varita de junco para evitar el ser arrastrado por la corriente. Cuando lo dejan momentáneamente para ir en busca de alimento, cubren sus huevos con las mismas hierbas del nido y así los preservan de peligro. El período de nidificación está comprendido desde el mes de mayo hasta septiembre y ponen de dos a tres huevos, de color blanco.

El plumaje de estas aves está impregnado de grasa, lo que les permite evitar la humedad.

Su tamaño es de veinte centímetros de largo. El pico es relativamente pequeño, recto y puntiagudo. Su parte superior es de color pardo grisáceo, inclusive el cuello; la inferior de un hermoso tono plateado e irregulares manchas parduzcas. Las alas están poco desarrolladas y la cola es rudimentaria. Las patas semipalmadas y los ojos amarillos. El cuerpo es grueso, redondeado y en general, toda su conformación está acondicionada para la vida acuática. En tierra se comporta con torpeza, camina con gran dificultad y al hacerlo tira el cuerpo hacia atrás en posición casi vertical.

Lo encontramos en el Sur de los Estados Unidos, Centro América, Las Antillas y la mayor parte de Sur América. En Venezuela se encuentra localmente en las ciénagas y lagunas de casi todo el país.

TUCUSITOS

AMAZILIA BRONCEADA

FAMILIA: TROCHILIDAE  
AMAZILIA TOBACI (Gmelin)

Los pájaros de la familia que nos ocupa se conocen en el país con el nombre de Tucusitos, Pájaros Moscas, Chupaflores y Colibríes. Constituyen un grupo de aves puramente americanas que tienen la particularidad de ser las más pequeñas del mundo; algunas de sus especies son del tamaño de un cigarrón y a veces más pequeñas aún. Otra característica es la de sus espléndidos colores, la mayoría de visos iridiscentes y destellos metálicos, algunos de ellos de tal espectacularidad que sólo podríamos compararlos con "piedras preciosas". Cuando vuelan lo hacen con tal rapidez que producen un susurro vibrante por el movimiento de las alas que es semejante al zumbido de las abejas. Tienen también la particularidad de quedarse sostenidos en el aire en un mismo sitio cuando están libando con su larga lengua en las corolas de las flores.

El Amazilia Bronceada es uno de estos colibríes que se encuentra generalmente en los bosques claros, plantaciones y jardines. En oportunidades se le puede observar volando en grupos alrededor de un árbol florecido o parado quietamente en un pequeño arbusto, en donde a veces permanece largo tiempo en la misma posición. Este colibrí mide diez centímetros de largo y todo él es de un verde brillante con visos iridiscentes, metálicos, en la parte superior. Las alas son negruzcas y la cola azul. El pico es negro por arriba y color carne en la parte inferior. Prácticamente viven en toda Venezuela, exceptuando los Andes. También se encuentran en las Islas de Trinidad, Tobago y Granada.

La nidificación la efectúan desde el mes de marzo hasta agosto, y su nido, que construyen en arbustos con pelusa vegetal, plumas y líquenes, tiene aproximadamente



cuatro cms. de diámetro y es de forma redondeada. Sus huevos son blancos, elípticos, de un tamaño de 13 x 8,5 mms. y la postura es sólo de dos huevos. Los machos y las hembras son similares y al igual que la mayoría de las especies de esta familia el macho no toma parte en la nidificación ni en la cría de sus pichones.

## COLIBRI INCA

COELIGENA COELIGENA (Lesson)

En las selvas a más de mil metros de altitud, vive este tucusito que podemos ver solitario entre los arbustos o en la vegetación baja, en donde busca su alimento, el cual, lo mismo que en los otros integrantes de esta familia, consiste en pequeños insectos y en néctar de flores.

Nidifica en mayo y junio. Su coloración general es de tonos parduzcos, con brillos verdosos en la parte superior, los cuales se van tornando en visos morados hacia el cuello y la corona. En la parte inferior es de color parduzco sin brillos, encontrándose este tono hacia el pecho y garganta, donde las plumas están bordeadas de blanco puro. Las alas son de color pardo y la cola de tonos bronceados. El pico es fino y largo con una longitud de 3,5 cms. y su tamaño es de catorce centímetros aproximadamente, incluso el pico. Es realmente un ave de gran belleza por su plumaje de tonos suaves y delicados. El macho y la hembra de esta especie son semejantes.

En Venezuela se encuentra distribuido en la Cordillera Andina, en las montañas altas de la Cordillera de la Costa Central y en las selvas de la Sierra de Perijá, siempre a la altura ya señalada.



## GÜITÍOS

### TICO - TICO

FAMILIA: FURNARIIDAE

PHILYDOR RUFUS (Vieillot)

Generalmente los encontramos solos en los arbustos o en el monte bajo de los bosques. Como todos los miembros de esta familia de los Furnaridos, conocidos comúnmente con el nombre de "Güitíos", son esencialmente pájaros insectívoros.

Este simpático y útil pajarito suele aprovecharse para construir sus nidos de algún hueco o excavación en los barrancos o también en las construcciones de concreto como los puentes de carreteras o caminos, en lugares selváticos, como en el caso del nido que aparece en la fotografía.

El Tico-tico tiene la espalda de un tono pardo aceitunado, con la corona gris parduzca; una lista superciliar de color canela pasa arriba de los ojos hasta la nuca. La parte inferior es de tono canela amarillento; la cola color castaño y las alas parduzcas, fuertemente bordeadas y cubiertas de plumas color castaño. La hembra y el macho son semejantes y tienen un tamaño de 19 centímetros aproximadamente.

La especie se encuentra desde la Argentina hasta Costa Rica.

En Venezuela habita en el ramal del Litoral de la Cordillera de la Costa y en el Cerro El Negro, Edo. Bolívar, a más de mil metros de altitud.



## ATRAPAMOSCAS

### CRISTOFUE

FAMILIA: TYRANNIDAE

PITANGUS SULPHURATUS (Linnaeus)

Alegre, intrépido y bullanguero es uno de nuestros pájaros más conocidos; su presencia rara vez pasa inadvertida. Se le puede escuchar a distancia dejando oír sus cantos que consisten en notas claras, fuertes y estridentes, de las cuales la más conocida parece decir: ¡Cristo fué!... ¡Cristo fué!... Cuando se reúnen varias parejas forman una gran algarabía al contestar sus llamadas y volar de árbol en árbol.

Generalmente se le observa en parejas en las ramas altas o en los alambres telegráficos, donde suelen pasar largos ratos atisbando los insectos que pocas veces escapan a su gran destreza y alcance visual. Cuando atrapan algún insecto de regular tamaño regresan a su sitio original y allí lo golpean fuertemente contra la rama para matarlo antes de comerlo. También podemos verlos descender con asombrosa rapidez sobre algún estanque para capturar pequeños peces. Cuando se trata de defender "su territorio" lo hacen con energía y bravura. Miles de insectos son destruidos por este

pájaro, por lo que se le puede considerar extremadamente beneficioso y por lo tanto merecedor de toda nuestra protección.

El Cristofué en su parte superior es de color pardo castaño, y en la parte inferior de un tono amarillo azufre con la garganta blanca. La cabeza negra con una semioculta corona de plumas amarillas, bordeadas por una franja de plumas blancas que llegan hasta la nuca. El pico es fuerte y de color negruzco. El macho y la hembra son semejantes en su coloración y miden aproximadamente 22 centímetros de largo.

Los nidos son voluminosos, contruídos de paja y hierba seca; herméticamente cerrados con la entrada en un costado. Su postura es de tres a cuatro huevos de forma ovalada y de color blanco con manchas pardas, moradas y purpúreo claro. Nidifican desde marzo hasta septiembre.

Se encuentra en casi todo el país, en lugares boscosos y no muy tupidos. También es frecuente verlos en los parques de las ciudades.

Vive desde el Sur de los Estados Unidos hasta Centro América y en gran parte de América del Sur.

### ATRAPAMOSCAS ACANELADO

PYRRHOMYIAS CINNAMOMEA (Lafresnaye y D'Orbigny)

Como todos los de esta familia de los Tyránidos, el Atrapamoscas acanelado se alimenta principalmente de insectos. Su distribución en el país está limitada a las cordilleras de los Andes y de la Costa, a alturas de más de mil metros sobre el nivel del mar. Suele posarse en los árboles a la orilla de los caminos, solos o en parejas. De allí se desprende en rápido vuelo para capturar los insectos que engulle con voracidad.

Acostumbra construir sus nidos en los barrancos, sobre cualquier protuberancia del terreno. Lo fabrica en forma de taza y lo elabora con hierbas, ramitas y musgos. Los huevos son blancuzcos con pintas pardas y violáceas. Nidifican desde abril hasta junio.

Este pajarito es muy atractivo y fácilmente reconocible por su intenso color castaño en la parte inferior; la espalda es castaño aceituno con una semioculta coronilla de plumas de vivo color amarillo; la cola es de color pardo oscuro y las alas del mismo tono, pero atravesadas por dos bandas de intenso color castaño. Su pico es corto, achatado y de color negruzco. Macho y hembra son similares en coloración. Su largo aproximado es de trece centímetros.

La especie se encuentra en los Andes, desde Argentina hasta Venezuela.

### BOBITO COPETON

ELAENIA CHIRIQUENSIS Lawrence

Este Atrapamoscas, además de insectos, incluye en su alimentación pequeñas frutas silvestres, las cuales busca al volar entre las ramas de los arbustos y la vegetación baja. El Bobito Copetón es un pájaro de colores apagados, pero su cresta y su vuelo rápido le dan una viva y audaz apariencia. Su parte superior es de color gris oliváceo con una cresta eréctil de color blanco en la base. La parte inferior es de tonos blanquecinos amarillentos con dos franjas blanquecinas en las alas. Mide aproximadamente quince centímetros de largo.

Su vida transcurre en las selvas claras, potreros y plantaciones, en donde es frecuente observarlo en su diaria actividad buscando el alimento solícitamente para sus crías. Fabrica el nido con fibras, paja, ramitas y telarañas; luego lo forra exteriormente con líquenes, con el fin de disimularlo y de esta manera protegerlo. Su postura es de dos a tres huevos, los cuales son de color blanco cremoso y pintados de rojo oscuro sobre manchas de color azulado o violeta. Anida durante la estación de las lluvias.

Lo encontramos desde Costa Rica hasta el Paraguay; en Venezuela cubre casi todo nuestro territorio.

### URRACAS

### QUERREQUERRE

FAMILIA: CORVIDAE

CYANOCORAX YNCAS (Boddaert)

Es una de nuestras aves de colorido atractivo y además muy conocida por su carácter arisco, a tal punto que ha dado origen a algunos dichos criollos tales como: "murió como el querrequerre" y otros que hacen alusión a la característica actitud irreductible de este pájaro, cuando se trata de tenerlo en cautiverio.



Tiene la corona de vivo color azul con pequeña cresta eréctil, espalda y alas verde-mar, garganta negro intenso y el resto del cuerpo de un tono amarillo canario. Su pico es fuerte, grueso y de color negro. Estas características, unidas a su tamaño relativamente grande, lo hacen ser una de nuestras aves hermosas y llamativas. Mide treinta centímetros de largo.

Frecuenta las regiones altas a más de mil metros sobre el nivel del mar y tiene especial preferencia por bosques tupidos, haciendas de café y lugares sombreados en donde se le observa en bandadas muchas veces hasta de veinte ejemplares saltando sobre los árboles. Su vuelo es corto, pero con gran agilidad. Se alimenta de frutas y de insectos. El canto consiste en notas a veces ásperas y otras agudas, estas últimas tan cortas que parecen campanitas; lo que ha dado origen a otro de sus nombres por el cual es conocido: "Quin-quin" o "Tin-tín".

Los nidos los construye con ramitas, palitos, paja, y asemeja un plato abierto. Nidifica desde el mes de abril hasta junio.

La especie se encuentra desde Bolivia por los Andes hasta Venezuela y por Centro América hasta Estados Unidos.



#### CUCARACHEROS

### CUCARACHERO

FAMILIA: TROGLODYTIDAE  
TROGLODYTES AEDON Vieillot

Inquieto, simpático y con una de las voces más melodiosas, puede describirse este interesante pajarito, ampliamente conocido por su costumbre de vivir en las cercanías de los lugares habitados por el hombre. Se encuentra en casi todo el país desde la Costa hasta las cordilleras más altas, siempre en parejas, dejando oír sus trinos que comienzan al aclarar el día. Su canto consta de un gorjeo de ocho a diez sílabas rápidas de tono fuerte y alegre. Siempre lo vemos saltar entre las ramas y arbustos o trepar por las paredes empuñados en su paciente tarea de minuciosa búsqueda en grietas y agujeros, en donde captura los insectos que constituyen la base de su alimentación. Vuela poco y prefiere para vivir los lugares semiabiertos, plantaciones y potreros.

El Cucarachero es de color castaño parduzco en la parte superior, y la inferior pardo blanquecino con las alas y la cola jaspeadas de color pardo negruzco. Su tamaño medio es de doce centímetros de largo.

Escoge para construir sus nidos, huecos o rendijas en las paredes o viejos muros y también en las concavidades de los techos. Sin embargo hay que decir que los Cucaracheros son unos de los pájaros más curiosos en cuanto a la escogencia del sitio en que han de construir sus nidos. Se han encontrado nidos fabricados en el bolsillo de un paltó colgado en un estante, o en el interior de la calavera de una vaca, y así se pudieran referir muchos casos en donde estos pajaritos caprichosos fabrican su hogar. La elaboración del nido es muy sencilla y sólo coloca algunas ramitas, chami-zas y pelusas en forma de plato abierto. Su postura es de cinco a ocho huevos, color crema pálido con manchas rojizas en tonos claros y oscuros.

La especie se encuentra desde Norte América hasta la Argentina. En Venezuela, en todo el país.

#### FRUTEROS

### FRUTERO PARAULATA

FAMILIA: THRAUPIDAE  
RHODINOCICHLA ROSEA (Lesson)

En pequeñas bandadas, dentro del follaje tupido, por el suelo o brincando en el monte bajo, se encuentra a este hermoso pájaro, el cual podemos reconocer con facilidad por su canto característico que consiste en trinos fuertes y melodiosos.

Se encuentra en pequeños grupos, pero sin embargo es muy difícil verlos por estar siempre ocultos entre la maraña de los matorrales en busca de alimento, que consiste en pequeños insectos.

Las distintas bandadas suelen contestarse sus llamadas y así forman un parloteo compuesto de notas graves y agudas de gran belleza que generalmente sobresalen por su tono fuerte a los otros cantos de pájaros. Suelen escucharse durante las primeras horas de la mañana y en las tardes cuando están activos en busca de la comida.

Su nido lo construye sobre una base bien elaborada de palitos gruesos en donde



luego fabrica lo que podemos llamar el verdadero nido, el cual es parecido a una taza, formado por los raquis y pecíolos de una planta pinada, posiblemente perteneciente al grupo de las leguminosas. Sus huevos son ovalados, de color azul verdoso y con pintas negras.

La época de su nidificación está comprendida desde el mes de mayo hasta agosto. El macho tiene la parte superior de color negro pizarra; la inferior es color rosa con la frente y superciliares de este mismo color. La hembra se reconoce por tener la parte superior parduzca y de color castaño la parte inferior y la frente. Mide veinte centímetros de largo.

La especie se encuentra en México, Costa Rica, Panamá, Colombia; en Venezuela habita en las serranías de la Cordillera de la Costa y Perijá.

## AZULEJO

THRUPIS VIRENS (Linnaeus)



En la proximidad de las viviendas humanas, en los árboles de nuestros jardines y acudiendo sin temor a los comederos artificiales, tenemos uno de nuestros pájaros más típicos y conocidos: el Azulejo. Lo encontramos viviendo en todo el territorio del país, desde el nivel del mar hasta los dos mil metros de altura. De vuelo rápido y largo, lo vemos en parejas o en grupos mayores en las ramas de los árboles, donde dejan oír sus silbidos agudos y variados. Además de las frutas, que es su principal alimento, también acostumbra comer insectos, los cuales caza en pleno vuelo.

Su nombre común describe su plumaje que es todo azul celeste en ricos y diferentes tonos; grisoso oscuro en la espalda, pálido en su parte inferior y las alas de vivo color azul de dos tonalidades. Tiene un tamaño medio de diecisiete centímetros de largo. La hembra es semejante. Es una de nuestras aves que más a menudo vemos enjauladas, y además víctima frecuente de las "chinas", por su abundancia cerca de zonas pobladas.

El Azulejo es un pájaro atractivo por su bello plumaje y relativa mansedumbre, que contribuye a embellecer nuestros huertos y plazas; por lo tanto es necesario protegerlo para conservar esta incalculable riqueza de armonía y gracia.

El macho es atento y solícito, ayuda a su compañera en la construcción del nido y luego cuando está incubando, se ocupa de buscarle el alimento.

Anida desde abril hasta septiembre y sus huevos que son ovalados, varían mucho de color, pero generalmente son blancos manchados o pintados de tonos pardos.

Se encuentra desde México hasta Brasil y Perú.

## CANDELO

PIRANGA FLAVA (Vieillot)

Se encuentra en todo el territorio del país en lugares a más de mil metros sobre el nivel del mar. Generalmente lo vemos en las ramas altas o en las copas de los árboles, solo o en parejas, brincando de rama en rama y algunas veces dejan oír sus suaves llamadas. Se alimenta de insectos, pero también suele comer granos y pequeñas frutas.

El nombre de Candelo, por el cual conocemos a este pájaro, le fué puesto por la coloración del macho, ya que la hembra es tan diferente con su plumaje amarillo que difícilmente pensamos que sea la misma especie. Tanto el macho como la hembra son de colores vivos, llamativos. El macho es todo rojizo, algo más oscuro en la parte superior. La hembra es de un color verde amarillento en la parte superior y amarillo limón en la parte inferior.

Durante la época de nidificación, los machos tienen un canto muy agradable compuesto de trinos fuertes y melodiosos. Los huevos son blancos salpicados de tonos chocolate.

La especie se encuentra desde Estados Unidos hasta Argentina.



El Para. Gu. 726 - 1962 -  
R. Amledo H. -



Candelo (Macho) *Piranga flava*




Querrequerre *Cyanocorax yncas*





Cristofué *Pitengus sulphuratus*



Bobito Copetón *Elaenia chiriquensis*



Frutero Paraulata (Macho) Rhodinocichla rosea



Azulejo *Thraupis virens*



Tico-Tico Rojizo *Philydor rufus*



Colibri Inca *Coeligena coeligena*



**Patito Zambullidor** *Podiceps dominicus*



Amazilia Bronceada Amazilia tobaci





Cucarachero *Troglodytes aedon*



Atrapamoscas Acanelado *Pyrrhomyias cinnamomee*