



**NUEVA SUBESPECIE  
DE LA FAMILIA PICIDAE  
DEL ESTADO LARA**

**Ramón Aveledo Hostos**

Separata del Boletín de la  
Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales  
Tomo XLVI - Mayo 1998 - No. 150

**CARACAS VENEZUELA**



**NUEVA SUBESPECIE  
DE LA FAMILIA PICIDAE  
DEL ESTADO LARA**

**Ramón Aveledo Hostos  
Comité de Ornitología**

Separata del Boletín de la  
Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales  
Tomo XLVI - Mayo 1998 - No. 150

**CARACAS VENEZUELA**

COMITÉ VENEZOLANO DE ORNITOLOGÍA  
BIBLIOTECA

## NUEVA SUBESPECIE DE LA FAMILIA PICIDAE DEL ESTADO LARA

**Ramón Aveledo Hostos**  
Comité de Ornitología

### INTRODUCCION

Este pequeño Carpintero *Picumnus cinnamomeus*, conocido como "TELEGRAFISTA CASTAÑO", solo se encontraba en "matorrales de la zona tropical" en el Estado Zulia; la nueva subespecie *larensis* que estamos describiendo, extiende el área de dispersión geográfica de la especie a la Sierra de Baragua en el Estado Lara, Venezuela.

El Estado Zulia, en las ultimas décadas ha sufrido el impacto del violento desarrollo ocasionado por las actividades agropecuarias y petrolíferas, por lo cual la fauna y la flora han sido drásticamente alteradas.

Los ecosistemas de variadas características ecológicas permitieron describir más de diez subespecies de la avifauna zuliana, pero la alteración o desaparición de su hábitat originales, es probable haya ocasionado cambios notables, incluso la desaparición de algunas de las subespecies descritas anteriormente.

Esta hipótesis sería valedera para toda la biodiversidad de esta extensa región de nuestro país, cuyo empobrecimiento biológico y deterioro ambiental es irrecuperable.

## **Picumnus cinnamomeus larensis**

### **nueva subespecie**

**HOLOTIPO:** De El Paraíso, río El Zurdo, Sierra de Baragua, Estado Lara, Venezuela, Altura 650 m., No. 11855, Colección Ornitológica, Museo de Rancho Grande, Maracay, Edo. Aragua. Hembra adulta, peso 11,5 gms., colectado el 21 de agosto de 1997 por R.A. Rivero (Depositado en el Museo de Rancho Grande, El Limón, Estado Aragua).

**DIAGNOSIS:** Más parecido a la raza *perijanus*, Zimmer y Phelps, 1944, cuyo tipo es de las Múcuras, río Palmar, Perijá, Zulia. Pero la nueva subespecie tiene la región frontal más blancuzca menos oscura, y la garganta, pecho y abdomen castaño más claro.

**DESCRIPCION DEL TIPO:** La etiqueta del Tipo indica, según el colector: largo total "107 mm."; pico "gris oscuro"; patas "gris claro"; uñas "pardo claro"; iris "pardo oscuro"; peso "11.5 gr."; hábitat "bosque denso semideciduo ribereño"; ala "50 mm."; cola "28 mm."; culmen expuesto "10 mm."

**AREA DE DISPERSION DE LA ESPECIE:** La especie se encuentra distribuida desde el nor-oeste de Colombia hasta el nor-este de Venezuela en los estados Zulia y Lara. La sub-especie *cinnamomeus*, descrita por Wagler en 1829, cuya localidad típica es Cartagena, Colombia. La subespecies *venezuelensis*, Cory 1913 de Encontrados, Zulia, Venezuela. La subespecies *perijanus*, Zimmer y Phelps 1944 de Las Múcuras, Río Palmar, Perijá, Estado Zulia, y la nueva subespecie *larensis*, que extiende el área de dispersión de la especie a la sierra de Baragua, Estado Lara, Venezuela.

**OBSERVACIONES:** Los dos ejemplares de la nueva subespecie *P.c. larensis*, son dos hembras adultas, pertenecientes al Museo de Rancho Grande, El Limón, Maracay, Estado Aragua. En tamaño son similares a las otras subespecies. *P.c. larensis*, incluyendo el tipo: alas, 50-53 mm.; cola,

25-29 mm.; culmen desde la base 10-9 mm. Estas medidas corresponden al de las subespecies *cinnamomeus*, *perijanus*, *venezuelensis*, que hacemos referencia en "ejemplares examinados".

**AGRADECIMIENTOS:** Dejamos constancia de nuestro agradecimiento al personal del museo de Rancho Grande, en especial al Sr. R.A. Rivero; a la colección Ornitológica W.H. Phelps, particularmente al Sr. Gilberto Perez Chinchilla; y al Lic. Farid Ayaach, director del Comité de Ornitología de la S.V.C.N.

### EJEMPLARES EXAMINADOS

*P. c. cinnamomeus* - VENEZUELA : Estado Zulia, (1) Paraguaipoa, Península de la Guajira 1♂, 2♀

*P. c. perijanus* - VENEZUELA : Estado Zulia, Palmarejo (1) 1♂ ; Las Múcuras, Río Socuy (1) 5♂ , 4♀ , 2 ? ; Manuelote, río Sucuy (2) 1♀ ; Villa del Rosario (1) 1♀ ; Mene Grande (1) 1♀ ; El Carbón, Río Guasare, (2) 2♂ .

*P. c. venezuelensis* - VENEZUELA : Estado Zulia, (1) Sta. Bárbara, Río Escalante 3♂ .

*P. C. larensis* - VENEZUELA : Estado Lara (2), Sierra de Baragua, El Paraíso 1♀ ; Sierra de Baragua, El Paraíso, Río El Zurdo 1♀ (tipo).

(1) Colección ornitológica W.H. Phelps, Caracas

(2) Colección ornitológica de Rancho Grande, Maracay, Estado Aragua

**REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS****ATLAS DE VENEZUELA**

1969 - Atlas de Venezuela, Ministerio de Obras Públicas,  
Dirección de Cartografía Nacional

**CALDASIA**

1949 - The Birds of the Republic of Colombia  
Rodolphe Meyer de Schauensee

**HNO. GINES, R. AVELEDO, G. YEPEZ Y R. MUÑOZ TEBAR**

1953 - La Región de Perijá y sus Habitantes. Lista y Comentarios  
de las Aves colectadas en la Región, Cap. XII, P. 225 - 277,  
Sociedad de Ciencias Naturales La Salle.

**AVELEDO RAMON - PEREZ LUIS**

1989 - Tres nuevas subespecies de Aves (Picidae, Parulidae, Thraupidae)  
de la Sierra de Perijá, Venezuela y Lista Hipotética para la Avifauna  
Colombiana de Perijá. Boletín de la Soc. Ven. Cien. Nat. tomo  
XLIII, N° 146

**PHELPS, W.H. Y PHELPS, W.H. (Jr:)**

1958 - Lista de las Aves de Venezuela con su distribución.  
Tomo II, Parte I, NO PASSERIFORMES,  
Bol. Soc. Ven. Cien. Nat. Vol. 74 N°. 90.



Area de dispersión de la especie *cinnamomeus* en Venezuela