

1000

# NOVEDADES CIENTIFICAS

CONTRIBUCIONES OCASIONALES  
DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL LA SALLE

CARACAS - VENEZUELA

APARTADO NO 681

---

Serie Zoológica

Junio de 1952

Nº 6

---

CUATRO AVES NUEVAS  
Y DOS EXTENSIONES DE DISTRIBUCION  
PARA VENEZUELA, DE PERIJA

EDITORIAL SUCRE

Teléf. 83915

Guneta, Cauca, 1 ♂, 1 ♀; Monte Socorro, Andes, 1 (?). ECUADOR (3): Papalacta, 7 ♂, 3 ♀, 1 (?); Otavalo, 2 ♂, 1 ♀; Mojarda, 1 ♀; Pichincha, 5 ♂, 1 ♀; Loja, 1 ♂, 1 (?); Sumaco Arriba, 2 ♂, 4 ♀; Oyacachi, 3 ♂; Guala, 2 ♂; Baeza Arriba, 2 ♂; Quito, 1 ♂, 1 (?); Asilan, Río Upano, 1 (?); Tambillo, Río Upano, 2 (?); Zuna, Río Upano, 5 (?); Galgatan, Río Upano, 2 (?).

C. *u. chakei*.—VENEZUELA: Frontera, Río Negro, Sierra de Perijá, 1 ♂ (tipo). VENEZUELA (8): Cerro Tetarí, Perijá, 14 ♂, 12 ♀, 7 (?).

## HENICORHINA LEUCOPHRYS MANASTARAE

(NUEVA SUBESPECIE)

**Tipo.**—De Manastara, Río Negro, Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela; altura, 1,140 metros. N° 1595, Museo de Historia Natural La Salle, Caracas. Hembra adulta coleccionada el 30 de diciembre de 1950 por el Rvdo. Hno. Angel (Tipo depositado en el American Museum of Natural History, New York, junto con los tipos de la Colección Phelps.)

**Diagnosis.**—Se asemeja más a *H. l. venezuelensis* Hellmayr, pero difiere de ella por tener, en la parte inferior de los costados, pantalones y cobertoras inferiores de la cola, un pardo más claro en vez de pardo rojizo. De *H. l. bangsi* Ridgway, de Santa Marta, difiere por tener la corona más oscura, más olivácea, menos amarilla; la espalda más oscura, más parda, menos rufa, y las partes inferiores de los costados, más oliva. Difiere de *H. l. tamae* Zimmer y Phelps y de *H. l. meridana* Todd, por tener las partes inferiores de los costados más claras y por su abdomen blancuzco en lugar de gris.

**Area de dispersión.**—Conocida solamente del Alto Río Negro, región de Perijá, en la zona subtropical. Desde 1.100 metros hasta 2.300 metros de altitud.

**Descripción del tipo.**—Corona y nuca, pardo bronceado (Medal Bronze), más oscuro hacia la frente, poseyendo las plumas un borde negruzco que les da la apariencia de finas escuamulaciones, menos conspicuas hacia la nuca; en los lados de la cabeza existe una ancha banda negra que llega hasta la nuca; espalda, rabadilla y cobertoras superiores de la cola, pardo castaño (Argus Brown); banda superciliar prominente que va desde los orificios nasales hasta los lados de la nuca; lóres negros lo mismo que una ancha línea post-ocular; parte inferior del párpado, blanco; auriculares inferiores (región malar) y lados de la nuca, listados de blanco con már-

genes negros en las plumas; barbilla y garganta, blancas con las plumas, hacia el pecho, bordeadas de obscuro; pecho y abdomen, gris cerca de (Pallid Neutral Gray), más obscuro hacia los lados; lados del abdomen y pantalones, pardo oliva (Buckhorn Brown); cobertoras inferiores de la cola, pardo ocre (Ochraceous Tawny). Alas, negro grisáceo (Fuscous); las tres rémiges exteriores, finamente orilladas de pardo grisáceo; las barbas exteriores de las demás rémiges, angostamente barreteadas de castaño rojizo, cerca de (Sudan Brown); las terciarias, más rufas y barreteadas en ambas barbas; los márgenes externos de las cobertoras superiores, pardo más claro que la espalda (Antique Brown); escapulares blancuzcas; axilares y cobertoras inferiores grises. Cola, pardo castaño claro (Brussels Brown x Argus Brown), angostamente barreteadas de negro. Pico "negro"; iris "pardo"; patas "pardas". Largo total, "100 milímetros"; ala, 52; cola, 28; culmen expuesto, 15; culmen desde la base, 18; tarso, 24.

**Observaciones.**—Sexos similares. Tamaño similar a *H. l. venezuelensis*. Variación de las medidas: Cuatro machos adultos: ala, 51-53 (52); cola, 27-28 (27,5); culmen desde la base, 18-19 (18,6); cinco hembras adultas (incluyendo el tipo): ala, 50-52 (51,5); cola, 27-29 (27,8); culmen desde la base, 18-19 (18,6). Medidas de *H. l. venezuelensis*: Quince machos adultos: ala, 52-56 (54,7); cola, 25-29 (26,9); culmen desde la base, 18,5-21 (19,7); siete hembras adultas: ala, 51-54 (52,4); cola, 25-26 (25,7); culmen desde la base, 19,20 (19,3). Aunque geográficamente la raza *bangsi* de Santa Marta es la más próxima, la nuestra se asemeja más a *venezuelensis*.

## EJEMPLARES EXAMINADOS

- H. l. bangsi*.—COLOMBIA (3): Valparaíso, Santa Marta, 7 ♂, 3 ♀, 1 (?); Las Nubes, 1 (?), 1 (?) [juv.]; El Líbano, 1 ♂, 1 (?) [juv.].
- H. l. venezuelensis*.—VENEZUELA (8): Cerro Golfo Triste, Aragua, 2 ♂, 2 ♀; Colonia Tovar, 3 ♂, 1 ♀; El Junquito, D. F., 2 ♂; San José de Los Caracas, 1 ♂; Guarenas, Miranda, 4 ♂, 1 ♀; Chirgua, Carabobo, 1 ♂; Hacienda Santa Clara, 2 ♂, 2 ♀; Bucaral, Yaracuy, 1 ♂, 1 ♀.
- H. l. manastarae*.—VENEZUELA (7): Jamayaujaina, 3 ♂, 5 ♀; Manastara, 1 ♂, 2 ♀; Kunana, 1 ♂, 1 (?); Ayapa, 1 ♀; Taramo, 1 ♀, 1 (?); Yamoré, 2 ♂, 2 ♀; Porotaponco, 1 ♀; El Escondido, 1 ♀; Quirinchi, 3 ♂, 4 ♀, 1 (?); Tutare, Perijá, 3 ♂, 2 ♀. VENEZUELA (8): Kunana, 2 ♀, 3 (?); Pejochaina, Perijá, 2 ♂, 4 ♀, 9 (?). VENEZUELA: Kunana, 4 ♂, 1 ♀, 1 (?); Manastara, Perijá, 2 ♀ (incluyendo el tipo).
- H. l. tamae*.—VENEZUELA (8): Las Delicias, 4 ♂, 1 ♀; Páramo Tamá, Camp., 5 ♂, 2 ♀; Villa Páez, 1 ♀ (?).

*H. l. meridana*.—VENEZUELA (8): Queniquea, Táchira, 2 ♂, 1 (?); Boca de Monte, Pregonero, 2 ♂, 1 ♀, 2 (?); Quintero, Mérida, 1 ♂, 2 ♀; Llano Rucio, 1 ♂; La Culata, 1 ♀; Páramo San Antonio, 1 ♀; El Valle, 1 ♂, 1 ♀, 1 (?); El Rincón, Cerro Niquitao, 3 ♂, 1 ♀; Cendé, Páramo Cendé, 1 ♂.

## CATHARUS AURANTIROSTRIS BARBARITOI

(NUEVA SUBESPECIE)

**Tipo.**—De Kunana, Río Negro, Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela; altura, 1.140 metros. N° 1200, Museo de Historia Natural La Salle, Caracas. Hembra adulta coleccionada el 26 de diciembre de 1949 por el Rvdo. Hno. Angel. (Tipo depositado en el American Museum of Natural History, New York, junto con los tipos de la Colección Phelps.)

**Diagnosis.**—Difiere de *C. a. aurantirostris* (Hartlaub) y *C. a. inornatus* Zimmer, *C. a. birchalli* Seebohm, por tener las partes superiores más pardo oliváceo en lugar de pardo amarillento del primero, oliva grisáceo del segundo y pardo rufescente del último; de *C. a. insignis* Zimmer, por ser ocráceo brillante.

**Area de dispersión.**—Conocido en la zona subtropical de la Sierra de Perijá, en el Valle del Alto Río Negro.

**Descripción del tipo.**—Frente y corona, pardo bronceado (Medal Bronze); nuca y espalda, oliva bronceado (Dresden Brown); cobertoras superiores de la cola, castaño pardusco (Brussels Brown); lores blancuzcos con las puntas pardas; lados de la cara, pardo oliva (Saccardo's Olive); barbilla y garganta blancas; pecho y costados grises (Pale Olive-Gray) con la punta de las plumas parduscas; abdomen blanco; cobertoras inferiores de la cola, blancuzcas, con las puntas castaño claro (Warm Buff). Parte superior de las rectrices, pardo obscuro (Clove Brown), marginadas de castaño pardusco (Brussels Brown) en sus barbas externas; parte inferior, pardo oliva (Olive-Brown) con las venas castaño claro. Parte superior de las rémiges, gris obscuro (Fuscous), marginadas, en sus barbas externas, de castaño pardusco claro (Buckthorn Brown); parte inferior, castaño oliva (Brownish Olive), tornándose gris claro hacia la base de las barbas interiores; cobertoras superiores del ala, oliva bronceado (Dresden Brown), harbinadas de castaño pardusco (Brussels Brown); cobertoras inferiores del ala, blancuzcas terminadas en castaño claro. Pico "amarillo"; patas "ama-