

UN AVE NUEVA DE LA REGION DE PERIJA

Ramon AVELEDO H

Conservador de la Coleccion Phelps

y

Adolfo PONS

Profesor de la Universidad del Zulia
Miembros Correspondientes

ACROCHORDOPUS ZELEDONI WETMOREI

(NUEVA SUBESPECIE)

TIPO —De Jamayaujaina, Rio Negro, Sierra de Perijá, Estado Zulia, altura, 1 640 metros N° 1980, Coleccion Pons, Maracaibo Macho adulto coleccionado el 30 de enero de 1951 por Moises Nava (Tipo depositado en el Amer Mus Nat Hist, New York)

DIAGNOSIS —Difiere de *A z leucogonys* (Sclater y Salvin) por tener la corona gris puro, menos grisáceo pardusco y parte dorsal de un verde más aceituno menos verde amarillento De *A z viridiceps* Zimmer y Phelps, en tener la corona gris en vez de aceitunoso

AREA DE DISPERSION —Conocido únicamente por la localidad típica

DESCRIPCION DEL TIPO —Frente, corona y nuca gris (Light Olive-Grey x Olive-Grey), una mancha grande blanca en la parte posnasal que cruza angostamente la base del pico Espalda y rabadilla verde oliva claro (*Peep Grape Green x Lincoln Green*), la cola gris castaño (*Hair Brown*), las rectrices finamente marginadas con verde uniforme con la espalda, y las tres rectrices externas ligeramente blancuzcas hacia la punta Los lores grises, parpado superior, blanco, una pequeña banda superciliar blanca desde la mitad de la orbita hasta un poco mas atras del borde posterior, raya posocular gris, region malar blanca con la base de las plumas negras, region auricular blanco grisoso, barbilla blanca, garganta y lados del cuello amarillo claro (Chartreuse Yellow) con los centros de las plu-

mas grososas, pecho amarillo olivaceo (*Line Green*), abdomen y dobles del ala amarillo limon (*Citron Yellow*), cobertoras inferiores ed la cola, amarillo mas claro, aspecto inferior de la cola gris oliva claro (*Light Grayish Olive*) Las alas gris obscuro (*Fuscous-Black*), las primarias excepto la prima angostamente marginadas con verde, uniformemente con la espalda, secundarias, terciarias y cobertoras superiores anchamente marginadas con amarillo, menos brillante que el del abdomen, cobertoras superiores del ala y axilares blancas maigen interno de las remiges, amarillo opaco restringido hacia la base en las otras plumas Maxila (en vida) "negro", mandibula 'blanco rosado', patas "gris obscuro", iris, "marrón" Largo total "105" mm, alas 61, cola 44 culmen expuesto, 9, culmen desde la base, 11 tarso, 14

OBSERVACIONES—Tamaño similar a *A z leucogonys*, excepto la cola que es mas grande Tamaño de *A z leucogonys* una hembra Zamora, Ecuador ala, 56 mm cola 42 culmen desde la base 11.4 Un (?) Buena-Vista, Colombia, y tres (?) "Bogota" ala 59-62 (60), cola 36-40 (38.2) culmen desde la base 10.5-11 (10.9)

Dedicamos la subespecie al Dr A Wetmore, secretario del Smithsonian Institution de Washington y uno de los mas distinguidos ornitologos

EJEMPLARES EXAMINADOS

A z leucogonys—Colombia Buena-Vista 1 (?) Bogota, 3 (?) Ecuador Zamora 1 ♀

A z viridiceps—Venezuela La Eduardera, Aguacatal Carabobo ⁽¹⁾ 1 (?), Rancho Grande Aragua ⁽²⁾, 1 ♂

A z wetmorei—Venezuela Jamavaujaina Zulia, 1 ♂

(1) Coleccion Ornitologica La Salle Valencia

(2) Estacion Biologica Rancho Grande