

REAVISTAMIENTO DE FALAROPA DE WILSON  
(*PHALAROPUS TRICOLOR*) EN EL REFUGIO DE FAUNA  
SILVESTRE CUARE, ESTADO FALCÓN, VENEZUELA

SANDRA B. GINER F.<sup>1</sup> Y MIGUEL LENTINO<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Postgrado de Ecología, Instituto de Zoología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela; email: sandra.giner@ciens.ucv.ve; <sup>2</sup>Colección Ornitológica W. H. Phelps, Caracas, Venezuela; email: lentino.miguel@gmail.com.

**Resumen:** Se reporta la presencia de la Falaropa de Wilson (*Phalaropus tricolor*) en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, en Venezuela, el 19 de mayo de 2008. No se registraba desde hace 23 años en el país, siendo este su cuarto reporte.

**Palabras clave:** Falaropa de Wilson, *Phalaropus tricolor*, Refugio de Fauna Silvestre Cuare, Venezuela

**Abstract:** RESIGHTING OF THE WILSON'S PHALAROPE (*PHALAROPUS TRICOLOR*) IN THE SILVESTRE CUARE WILDLIFE REFUGE, FALCÓN STATE, VENEZUELA. We report the presence of a Wilson's Phalarope (*Phalaropus tricolor*) at the Refugio de Fauna Silvestre Cuare, in Venezuela, on 19 May 2008. This is the fourth record for Venezuela and the first in 23 years.

**Key words:** *Phalaropus tricolor*, Refugio de Fauna Silvestre Cuare, Venezuela, Wilson's Phalarope

**Résumé :** NOUVELLE OBSERVATION DU PHALAROPE DE WILSON (*PHALAROPUS TRICOLOR*) DANS LA RESERVE DE FAUNE DE SILVESTRE CUARE, ETAT DE FALCON, VENEZUELA. Nous signalons la présence d'un Phalarope de Wilson (*Phalaropus tricolor*) à la réserve de faune Refugio de Fauna Silvestre Cuare, au Venezuela, le 19 Mai 2008. C'est la quatrième donnée pour le Venezuela et la première depuis 23 ans.

**Mots clés :** Phalarope de Wilson, *Phalaropus tricolor*, Refugio de Fauna Silvestre Cuare, Venezuela

La Falaropa de Wilson (*Phalaropus tricolor*) es un ave migratoria de paso en el norte de Suramérica (Restall *et al.* 2007). Esta especie tiene su área de distribución en el norte de Alberta y este de California hasta los Grandes lagos en Norteamérica, durante la estación reproductiva, y presenta poblaciones pequeñas dispersas e inverna desde el norte de Perú hasta Uruguay y el sur hasta Tierra del Fuego (van Gils y Wiersma 1996).

Restall *et al.* (2007) señalan la presencia de la Falaropa de Wilson al norte de Suramérica entre agosto y septiembre, y nuevamente en marzo. Es un invernante común en Ecuador, donde se ha registrado durante todo el año y se han observado hembras en plumaje reproductivo entre Junio–Julio (Ridgely y Greenfield 2001). En Colombia es un transeúnte raro durante el otoño y muy raro en Venezuela (Restall *et al.* 2007). En las Antillas se ha señalado en Trinidad y Tobago entre agosto y octubre, siendo un visitante raro de los humedales internos (Kenefick *et al.* 2008). Para Bonaire hay por lo menos tres registros entre enero y marzo (Voous 1983). Para Surinam hay un registro de septiembre (Haverschmidt y Mees 1994). En Brasil se ha registrado en Mato Grosso (agosto) y Rio Grande do Sul (noviembre, enero) (Sick 1984).

Los principales hábitat de invernada son las planicies fangosas y someras, lagos salinos de aguas abiertas en las tierras altas de los Andes en Perú, Chile, oeste de Bolivia y noroeste de Argentina, y en forma dispersa en humedales de agua dulce, en las pampas y en charcas alcalinas (van Gils y Wiersma 1996).

El primer registro de la Falaropa de Wilson señalado para Venezuela fue en Noviembre de 1977, en el Refugio de Fauna Silvestre (RFS) Cuare, donde se observó un individuo con plumaje de invierno en dos oportunidades (Altman y Parrish 1978). Posteriormente, se observó en la Laguna de Chacopata al norte de la Península de Araya, estado Sucre, en septiembre 1984; un individuo con plumaje de invierno alimentándose en el fango húmedo. Nuevamente, en mayo de 1985, se registró una hembra con plumaje reproductivo, nadando y alimentándose en una laguneta de agua dulce cercana a la Laguna de Chacopata (McNeil *et al.* 1987).

Un reavistamiento de esta especie se efectuó el 19 de mayo de 2008, en la boca del caño El Estero en la albufera norte del RFS Cuare, Chichiriviche, estado Falcón. El individuo fue observado alimentándose en la orilla de la albufera, en la zona húmeda de la franja litoral, junto a una bandada de Playeros



Fig. 1. *Phalaropus tricolor*, macho con plumaje reproductivo, en el RFS Cuare, Chichiriviche, estado Falcón, Venezuela, el 19 de mayo de 2008. Foto por Sandra Giner.

rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*). Presentaba un plumaje de macho reproductivo, con una franja de color oscuro desde la zona auricular que desciende a los lados de la garganta y se ensancha con una pequeña entrada entre el pecho y la garganta; las plumas en el dorso bordeadas de blanco dan una apariencia de escamado en la parte posterior del dorso, una línea superciliar blanca cruza desde la frente hasta el ojo y marrón rojizo sobre las auriculares (Fig. 1). Este es el segundo registro en Venezuela, de esta especie en plumaje reproductivo durante el comienzo de la primavera.

Han transcurrido 31 años desde el último reporte de esta especie en el RFS Cuare, y 23 desde el último registro en Venezuela. Esta ave tiende a pasar inadvertida debido a que es fácilmente confundible con otros playeros, pero el cúmulo de registros ya existentes para el norte de Suramérica indican de

que es una especie más frecuente de lo que sospechaba.

#### AGRADECIMIENTOS

Al personal del Ministerio del Ambiente en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare por su apoyo durante las salidas de campo, a Fudena por facilitar sus instalaciones en Chichiriviche, estado Falcón. A Verónica Pacheco, Felipe Madrid y Germán Araujo quienes colaboraron en las actividades de campo.

#### LITERATURA CITADA

- ALTMAN, A., Y C. PARRISH. 1978. Sight records of Wilson's Phalarope, Ruff, and other shorebirds from Venezuela. *American Birds* 32:309–310.
- HAVERSCHMIDT, F., Y G. F. MEES. 1994. *Birds of Suriname*. VACO Press, Paramaribo.
- KENEFICK, M., R. RESTALL, Y F. HAYES. 2008. *Field guide to the birds of Trinidad & Tobago*. Yale University Press, New Haven, CT.
- MCNEIL, R., B. LIMOGES, F. MERCIER, Y J. R. RODRÍGUEZ. 1987. Wilson's Phalarope in South America. *American Birds* 41:391.
- RESTALL, R., C. RODNER, Y M. LENTINO. 2007. *Birds of northern South America: an identification guide*. Vol. 1: Species accounts. Yale University Press, New Haven, CT.
- RIDGELY, R. S., AND P. J. GREENFIELD. 2001. *The birds of Ecuador*. Helm, London.
- SICK, H. 1984. *Ornitología Brasileira, uma introducao*. Vol. 1. 3ª edn. Linha Gráfica Editora, Brasília.
- VAN GILS, J., Y P WIERSMA. 1996. Family Scolopacidae (snipes, sandpipers and phalaropes). Pp. 444–533 in *Handbook of the birds of the world*. Vol. 3: Hoatzin to auks (J. del Hoyo, A. Elliot, y J. Sargatal, eds.). Lynx Ediciones, Barcelona.
- VOOUS, K.H. 1983. *Birds of the Netherlands Antilles*. Foundation for Science Research in Suriname and the Netherlands Antilles, Utrecht.