



UN AVE NUEVA PARA VENEZUELA

por Hno. Ginés y Ramón Azeledo Hostos
Miembros de la S C N La Salle

De la identificación de la numerosa e interesante colección ornitológica que, recientemente, adquirió la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle en su expedición a las grandes Serranías de Perijá, hemos querido adelantar la publicación de una especie desconocida hasta el presente en Venezuela, la cual viene a enriquecer la ya larga lista de la avifauna patria

Se trata de la

Myrmeciza laemosticta palliata Todd Hormiguero pechinegro.

Myrmeciza laemosticta palliata Todd, Pro Biol Soc Wash., 30 1917 p 129 (La Palmita, State of Santander o Colombia), Bangs and Barbour, Bull Comp Zool 65, No 6 1922 p 207 (Mt Sapó, Darién, Panamá)

Un ejemplar macho, Ayapa, Perijá, Edo Zulia.—Dic 31 de 1947

No hemos encontrado inconveniente en referir este ejemplar a la subespecie *palliata*, ya que ella fué descrita basándose en un ejemplar procedente de La Palmita, Santander (Colombia), enclavada como está dicha localidad, a 1 200 m de altitud en los Andes Orientales de la hermana república, cuya continuación natural es la Serranía de Perijá. Nuestro ejemplar fué coleccionado a 1 100 m. No obstante, el espécimen se comparará próximamente con el tipo de *palliata*, con el fin de ver si nuestra ave no constituye una nueva especie para la ciencia

Distribución: Parte Norte de Colombia en los Departamentos de Santander (La Palmita) y Antioquia (Puerto Valdivia Bajo Cauca). Este de Panamá (Mt. Sapó, Darién). Y, ahora, Noroeste de Venezuela, Ayapa, Perijá; Estado Zulia

Descripción: Macho adulto.—Parte superior: La cabeza y la nuca son de un color gris oscuro, la parte anterior de la espalda, castaño oliváceo oscuro con las plumas de la espalda, negras hacia el centro y, extensivamente blancas, hacia la base. Parte posterior de la espalda, rabadilla y cobertoras superiores de la cola, de color castaño rojizo, la cola símililar aunque un poco más oscura. Las cobertoras medias y superiores de las alas, negras y terminadas cada una de ellas con una pequeña mancha blanca redondeada en forma de punto. Algunas de esas cobertoras tienen las plumas completamente blancas a lo largo del borde anterior del ala y por su parte exterior. Las cobertoras secundarias son de un castaño rojizo y terminan algunas también en pequeños puntos pero de un color castaño claro. Las rémiges son de un gris oscuro y marginadas, exteriormente, de castaño rojizo

Parte inferior: La garganta y parte anterior del pecho, negros. Pecho y parte superior del abdomen, gris cenizo oscuro. La parte posterior del abdomen, lados del



cuerpo y cobertoras inferiores de la cola de color castaño olivaceo. El pico, negro. Patas negruzcas

La hembra es similar, pero con el pecho conspicuamente punteado de blanco y la parte posterior de la nuca, de castaño oscuro

Nuestro ejemplar mide un largo total de 160 mm y pesó 24 gr Ala, 66 mm.; cola, 48 mm , culmen, 20 mm ; tarso, 26 mm.; dedo medio, 18 mm.

La lista del resto de la colección así como los estudios realizados al respecto por la Comisión de Zoología serán publicados próximamente en futuras Memorias.

Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer al Sr. W. H. Phelps su inapreciable ayuda al permitirnos gentilmente hacer uso de su colección y biblioteca, lo mismo para felicitar a los componentes de la Comisión de Zoología por la labor realizada en Perijá.

OBRAS CONSULTADAS:

W. E. Clyde Todd:

New genera, species, and subspecies of South American birds.

Proceedings of the Biological Society of Washington. Vol. 30-31. 1917-1918

Cory and Hellmery:

Catalogue of birds of the Americas and the adjacent Islands

Field Museum of Natural History, Zoo Ser, Vol XIII, part. III.

Phelps W. H.:

Las Aves de Perijá Bol Soc. Ven Cien Nat., No 56, pp. 265-338, Jul -Sep , 1943.